

PROSPEKTÜS

TİLMOKİN-SOL

Oral Çözelti Veteriner
Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Tilmokin-Sol oral çözelti, sarı-amber arası renkte berrak bir çözelti olup, 1 ml 'de, 250 mg Tilmikosin baza eşdeğer tilmikosin fosfat içerir.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Tilmikosin makrolid grubundan semisentetik bir antibiyotiktir. Diğer makrolidlere benzer ve Gram (+) bakterilere karşı olmakla birlikte bazı Gram (-) mikroorganizmalara ve mikoplazma türlerine karşı da etkilidir. Antibakteriyel spektrumunda Mycoplasma gallisepticum, Clostridium perfringens, Mycoplasma synovia, Staphylococcus aureus, Actinomyces pyogenes, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida, Escheria coli gibi mikroorganizmalar bulunur.

Tilmikosin, bakteriyostatik nitelikli bir antibakteriyel etkinlik gösterir. Etki şekli, diğer makrolit grubu antibiyotiklerde olduğu gibi bakterilerde protein sentezini engellemek suretiyledir. Bu olay translokasyon basamağının interferens yolu ile protein sentezinin inhibisyonu şeklindedir.

Kanatlılarda oral yolla uygulandığında tilmikosin hızla emilerek kana karışır. Yine kan dolaşımını hızlı bir şekilde terk ederek pasif diffüzyon ile kolayca düşük yoğunlukta pH'ya sahip enfeksiyon bölgelerine geçer. Uygulamadan 6 saat sonra, akciğerler ve hava keselerinde, tilmikosin yoğunluğu pik noktaya ulaşır. Tilmikosin safra ve idrar yolları ile atıldığından, karaciğer ve böbreklerdeki konsantrasyonunda oldukça yüksektir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Tilmokin-Sol, tavuk ve hindilerin Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida ve tilmikosine duyarlı diğer mikroorganizmaların yol açtığı solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Tilmokin-Sol Oral Çözelti, tavukların içme suyuna katılmak suretiyle, oral yolla kullanılır.

Farmakolojik Doz :

20 mg/kg/gün canlı ağırlık olarak hesaplanarak, tamamı günlük tüketilecek içme suyuna ilave edilerek uygulanır. Pratik Doz:

Tavuk ve hindiler için 2 ml TİLMOKİN-SOL/25 kg canlı ağırlık /gün'dür.

Hayvan türlerine ve canlı ağırlıklara göre pratik doz seçimi için aşağıdaki tablo kullanılabilir:

Canlı Ağırlık	Verilecek günlük TİLMOKİN-SOL miktarı	Canlı ağırlık	Verilecek günlük TİLMOKİN-SOL miktarı
600 kg	48 ml	6000 kg	480 ml
1200 kg	96 ml	9000 kg	720 ml
3000 kg	240 ml	12000 kg	960 ml

Günlük doz; günlük içme suyunun 1/3 'üne katılarak verilmelidir. Uygulamaya 3 gün devam edilmelidir. Semptomlar kaybolduktan sonra 1-2 gün tedaviye devam edilmelidir, ilaçlı su her gün tazelenmelidir.

YANETKİLERİ

Belirtilen dozlarda ve kanatlı türlerinde kullanılması durumunda herhangi bir yan etkisi görülmez.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Fenikoller, linkozamidler ve diğer makrolid antibakteriyeller ile antagonizma nedeniyle birlikte uygulanmamalıdır.

GIDALARDAKİ İLAÇ KALINTILARI HAKKINDA UYARILAR

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, elçi tavuklar 14 gün, hindiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan gıdası olarak tüketilen hindi ve tavuklarda kullanılmamalıdır.

DOZ AŞIMI VE ALINACAK ÖNLEMLER

Tilmikosin kanatlı hayvanlar için oldukça güvenli olup, 5 gün süre ile 375 mg/kg dozda uygulandığında herhangi bir olumsuz etki görülmemiştir.

KONTRENDİKASYONLAR

Kanatlılarda belirtilen dozlarda kullanıldığında kontrendikasyonu yoktur. Diğer hayvan türlerinde kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

Ambalajı hasarlı olan ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER VE HEKİMLER İÇİN UYARILAR

Tilmokin-Sol Oral Çözelti, deriyle temas durumunda hassasiyet görülebilir, ilacın kullanımı sırasında koruyucu eldiven ve elbise giyilmelidir. Kullanım sonrasında eller yıkanmalıdır. Deri ile temasta, temas yerleri çok iyi yıkanmalıdır, ilacın gözle temasından kaçınılmalıdır. Göz ile temas durumunda gözler iyice yıkanmalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

30° C 'nin altında direkt güneş ışığından korunarak ve dondurulmadan saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 240 mL, 480 mL ve 960 mL'lik amber renkli polietilen şişelerde sunulmuştur.

İç ve Pis Ambalaj Etiketleri İç ve Dış Ambalaj Etiketleri

TİLMOKİN-SOL

Oral Çözelti Veteriner

Sistemik Antibakteriyel

BİLEŞİMİ

Tilmokin-Sol oral çözelti, sarı-amber arası renkte berrak bir çözelti olup, 1 ml 'de, 250 mg Tilmikosin baza eşdeğer tilmikosin fosfat içerir.

KULLANIM SAHASI / ENDİKASYONLAR

Tilmokin-Sol. tavuk ve hindilerin Mycoplasma gallisepticum, M. synoviae, Ornithobacterium rhinotracheale, Pasteurella multocida ve tilmikosine duyarlı diğer mikroorganizmaların yol açtığı solunum yolu enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU

Veteriner Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde;

Tilmokin-Sol Oral Çözelti, tavukların içme suyuna katılmak suretiyle, oral yolla kullanılır.

Farmakolojik Doz:

20 mg/kg/gün canlı ağırlık olarak hesaplanarak, tamamı günlük tüketilecek içme suyuna ilave edilerek uygulanır. Pratik Doz:

Tavuk ve hindiler için 2 ml TİLMOKİN-SOL/25 kg canlı ağırlıktır/gün'dür.

Günlük doz ; günlük içme suyunun 1/3 'üne katılarak verilmelidir. Uygulamaya 3 gün devam edilmelidir.

Semptomlar kaybolduktan sonra 1-2 gün tedaviye devam edilmelidir. İlaçlı su her gün tazelenmelidir.

İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s.): Tedavi süresince ve son ilaç uygulamasından sonra, etçi tavuklar 14 gün, hindiler 10 gün geçmeden kesime gönderilmemelidir. Yumurtası insan gıdası olarak tüketilen hindi ve tavuklarda kullanılmamalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce ve beklenmedik bir etki görüldüğünde veteriner hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde bulundurunuz.

Gıda maddelerinden uzakta bulundurunuz.

Ambalajı hasarlı olan ürünleri satın almayınız ve kullanmayınız.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

30° C'nin altında direkt güneş ışığından korunarak ve dondurulmadan saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içinde 240 mL, 480 mL ve 960 mL' lik amber renkli polietilen şişelerde sunulmuştur.